

Tabella 1. Località di presenza di *Euleptes europaea* in Liguria.

Località	Comune	Altitudine (m)	Habitat
Quezzi	Genova	320	ruderi e muretti di recente costruzione
S. Siro di Struppa	Genova	150	abitazione e muretti a secco
Torrazza	S. Olcese	320	abitazione e muretti contenimento strada
Sussisa	Sori	310	abitazione
Isola Tino	Portovenere	2-40	ruderi, calcinacci, pietraia, sotto corteccia di olmi morti
Isola Tinetto	Portovenere	2	ruderi, pietraia

RISULTATI E DISCUSSIONE

La tabella 1 riporta la lista dei siti di presenza e i relativi habitat della specie in Liguria. Il Tarantolino è noto con certezza solo dei dintorni di Genova e delle due isole nel golfo di Portovenere in provincia di La Spezia. Ricerche notturne lungo la costa tra La Spezia e Portovenere e sull'isola della Palmaria hanno dato, fino ad oggi, esito negativo. Gli habitat in cui la specie è stata rinvenuta sono vari, sia artificiali (muretti, ruderi e abitazioni con scarsa frequentazione umana), sia naturali (alberi morti e pietraia) (Oneto *et al.*, in press). Nel sito di Quezzi, il Tarantolino ha colonizzato in pochi mesi un muretto appena costruito a pochi metri dal manufatto principale.

Tabella 2. Dieta di *Euleptes europaea* della popolazione di Genova. LMC = lunghezza muso-ano in mm.

Data	Preda osservata	T aria (°C)	Note
20 luglio 1998	1 formicidae	24	-
20 luglio 1998	1 formicidae	24	-
9 maggio 1999	1 formicidae	22	-
9 maggio 1999	1 formicidae	22	-
9 maggio 1999	1 formicidae	22	-
23 luglio 2002	1 formicidae alato	22	-
28 maggio 2005	1 blattaridae	21	-
28 maggio 2005	1 blattaridae	21	-
28 maggio 2005	1 dermattero	21	maschio LMC = 38 mm
5 giugno 2006	1 araneidae	17	-

(*Segesta* cfr. *sinoculata*)

